

レジメンコード 150048
 レジメン名称 TC weekly
 投与間隔 7 日
 備考 AUC 2

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 50 m L 1.5 瓶 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 250 m L 60 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 | 250 m L 0 m g / A | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分 — 以下余白 — | 250 m L | |