

レジメンコード150049

レジメン名称 TCB (DEX 19.8mg) ワーファリン内服者用

投与間隔 21 日

備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 175 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g / kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分  - 以下余白 -	100 m L	