

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/15

| <薬品名・用法>   | <用量>                                | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>1.5 瓶<br>1 管             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分                                   | 1 袋                                 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚糖液5% [500mL/袋]<br>後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 3時間              | 500 m L<br>175 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>注射用イホマイド1g<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 1時間  | 250 m L<br>1 g / m <sup>2</sup>     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>側管 ④と同時に投与開始<br>点滴時間 30分              | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 1時間                         | 500 m L<br>1 管                      |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/15

| <薬品名・用法>   | <用量>                                | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>点滴時間 1時間             | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑧<br>点滴時間 1時間        | 250 m L<br>20 m g / m <sup>2</sup>  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「タカ」[2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑨<br>点滴時間 2時間 | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑩<br>側管 ⑨と同時に投与開始<br>点滴時間 30分  | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 1 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑪<br>点滴時間 2時間                                       | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑫<br>点滴時間 2時間                                       | 500 m L                             |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：3/15

| <薬品名・用法>  | <用量>                                | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑬<br>側管 ⑫と同時に投与開始<br>点滴時間 30分             | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B]<br>後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑭<br>側管 ⑫と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 管                       |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑮<br>点滴時間 2時間<br><br>— 以下余白 —                                  | 500 m L                             |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/15

| <薬品名・用法>   | <用量>                                | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 2時間  | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>○化学療法で実施<br>②<br>側管 ③投与前に終了<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>1.5 瓶<br>1 管             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>注射用イホマイド1g<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間  | 250 m L<br>1 g / m <sup>2</sup>     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③と同時に投与開始<br>点滴時間 30分                            | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：5/15

| <薬品名・用法>  | <用量>                                | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>点滴時間 1時間       | 250 m L<br>20 m g / m <sup>2</sup>  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑧<br>点滴時間 2時間 | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑨<br>側管 ⑧と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 1 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑩<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑪<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑫<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：6/15

| <薬品名・用法>  | <用量>          | <メモ> |
|---|---------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑬<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液 [500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑭<br>点滴時間 2時間<br><br>— 以下余白 —                                   | 500 m L       |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：7/15

| <薬品名・用法>   | <用量>                                | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 2時間  | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>○化学療法で実施<br>②<br>側管 ③投与前に終了<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>1.5 瓶<br>1 管             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>注射用イホマイド1g<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間  | 250 m L<br>1 g / m <sup>2</sup>     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③と同時に投与開始<br>点滴時間 30分                            | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：8/15

| <薬品名・用法>  | <用量>                                | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>点滴時間 1時間       | 250 m L<br>20 m g / m <sup>2</sup>  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑧<br>点滴時間 2時間 | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑨<br>側管 ⑧と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 1 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑩<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑪<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑫<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：9/15

| <薬品名・用法>  | <用量>          | <メモ> |
|---|---------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑬<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液 [500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑭<br>点滴時間 2時間<br><br>— 以下余白 —                                   | 500 m L       |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：10/15

| <薬品名・用法>   | <用量>                                | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 2時間  | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>○化学療法で実施<br>②<br>側管 ③投与前に終了<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>1.5 瓶<br>1 管             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>注射用イホマイド1g<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間  | 250 m L<br>1 g / m <sup>2</sup>     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③と同時に投与開始<br>点滴時間 30分                            | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：11/15

| <薬品名・用法>  | <用量>                                | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>点滴時間 1時間       | 250 m L<br>20 m g / m <sup>2</sup>  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑧<br>点滴時間 2時間 | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑨<br>側管 ⑧と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 1 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑩<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑪<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑫<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：12/15

| <薬品名・用法>  | <用量>          | <メモ> |
|---|---------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑬<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液 [500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑭<br>点滴時間 2時間<br><br>— 以下余白 —                                   | 500 m L       |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：13/15

| <薬品名・用法>   | <用量>                                | <メモ> |
|--|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 2時間  | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>○化学療法で実施<br>②<br>側管 ③投与前に終了<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>1.5 瓶<br>1 管             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>注射用イホマイド1g<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間  | 250 m L<br>1 g / m <sup>2</sup>     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③と同時に投与開始<br>点滴時間 30分                            | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 1時間                                       | 500 m L<br>1 管                      |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：14/15

| <薬品名・用法>  | <用量>                                | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>点滴時間 1時間       | 250 m L<br>20 m g / m <sup>2</sup>  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) ソルアセトF輸液[500mL/袋]<br>後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑧<br>点滴時間 2時間 | 500 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑨<br>側管 ⑧と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 1 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑩<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑪<br>点滴時間 2時間                                      | 500 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>ウロミテキサン注400mg[4mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑫<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 150054

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：15/15

| <薬品名・用法>  | <用量>          | <メモ> |
|---|---------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑬<br>側管 ⑪と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>KN 3 号輸液 [500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑭<br>点滴時間 2時間<br><br>— 以下余白 —                                   | 500 m L       |      |