

レジメンコード 150055

レジメン名称 TNB (DEX 19.8mg)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 175 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L 0.75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクワラミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間30分	500 m L 1 管	

レジメンコード 150055

レジメン名称 TNB (DEX 19.8mg)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクワラミド注射液 10mg「効効」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 mL 1 管	

レジメンコード 150055

レジメン名称 TNB (DEX 19.8mg)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 0.75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150055

レジメン名称 TNB (DEX 19.8mg)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 0.75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		