

レジメンコード 150056

レジメン名称 TP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 12時間	250 m L 67.5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 12時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 12時間	250 m L 67.5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 8時間	500 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 150056

レジメン名称 TP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 側管 前日⑥終了後投与開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 側管 ①終了後投与開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 150056

レジメン名称 TP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分  — 以下余白 —	50 m L 0.5 管	

レジメンコード 150056

レジメン名称 TP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセト F 輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間30分  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150056

レジメン名称 TP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間30分  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150056

レジメン名称 TP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150056

レジメン名称 TP

投与間隔 21 日

備考

病日 6 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	