

レジメンコード 150058

レジメン名称 VP-16

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ①	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトキシド点滴静注液100mg「サト」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 150058

レジメン名称 VP-16

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ①	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトキシド点滴静注液100mg「サト」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 150058

レジメン名称 VP-16

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ①	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトキシド点滴静注液100mg「サト」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 150058

レジメン名称 VP-16

投与間隔 14 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ①	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトキシド点滴静注液100mg「サト」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 150058

レジメン名称 VP-16

投与間隔 14 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ①	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトキシド点滴静注液100mg「サト」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	