

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 0.11 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 1.2 g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクプラミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑨と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：3/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 側管 ⑬と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑮ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 0.11 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 1.2 g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：5/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：6/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管 ⑫と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：7/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 1.2 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：8/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	



レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：9/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管 ⑫と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：10/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 1.2 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：11/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：12/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管 ⑫と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：13/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 1.2 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：14/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 150059

レジメン名称 VeIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：15/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管 ⑫と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	