

レジメンコード 150061
 レジメン名称 dd-TC (DEX 6.6mg)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 100 m L 1 瓶 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 500 m L 80 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 | 250 m L 0 m g / A | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間 | 200 m L | |
| — 以下余白 — | | |

レジメンコード 150061
 レジメン名称 dd-TC (DEX 6.6mg)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 8 日目

ページ数：2/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 100 m L 1 瓶 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 500 m L 80 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 | 200 m L | |
| — 以下余白 — | | |

レジメンコード 150061
 レジメン名称 dd-TC (DEX 6.6mg)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 15 日目

ページ数：3/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 100 m L 1 瓶 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 500 m L 80 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 | 200 m L | |
| — 以下余白 — | | |