

レジメンコード 150067

レジメン名称 KEY+TPB

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 200 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」[2mL/管] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注「ハック」1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ-ラ」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 12時間	250 m L 87.5 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 12時間	500 m L	

レジメンコード 150067
 レジメン名称 KEY+TPB
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 12時間	250 m L 87.5 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 8時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150067
 レジメン名称 KEY+TPB
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 側管 前日⑨終了後投与開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 側管 ①終了後投与開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 50 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 150067
 レジメン名称 KEY+TPB
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 150067

レジメン名称 KEY+TPB

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセト F 輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間30分 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150067
 レジメン名称 KEY+TPB
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間30分 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150067
レジメン名称 KEY+TPB
投与間隔 21 日
備考

病日 5 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		