

レジメンコード 030004  
 レジメン名称 CBDCA/PAC (アロカリス)  
 投与間隔 21 日  
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法>  | <用量>                                | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管]<br>ポララミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>3 瓶<br>1 管<br>1 管         |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」<br>アロカリス点滴静注235mg [10mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分                                      | 1 袋<br>1 瓶                          |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚糖液5% [500mL/袋]<br>後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 3時間   | 500 m L<br>175 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚糖液5% [250mL/袋]<br>カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 1時間  | 250 m L<br>0 m g / A                |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 15分<br><br>— 以下余白 —  | 50 m L                              |      |