

レジメンコード 031002
 レジメン名称 weekly nab-PAC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 031002
 レジメン名称 weekly nab-PAC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 031002
 レジメン名称 weekly nab-PAC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 mL	