

レジメンコード 031007
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	1000 m L 1 キット 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ`1mg/50mL「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) リナカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイバ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	250 m L 70 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	1000 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間 - 以下余白 -	1000 m L	

レジメンコード 031007
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	250 m L 70 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	