

レジメンコード 031010
 レジメン名称 HER (初回8mg/kg) /Cap/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考 ゼロータ 1000mg/m²/回 day 1-14

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) ホスアプレピタント点滴静注用 150mg 「NK」 デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ハーセプチン注射用 150 [7.2mL/150mg/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	250 m L 8 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ 「フソー」 [1L/袋] K C L 注 20mEq キット 「テルモ」 [1mL/20mL/筒] 硫酸Mg補正液 1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	1000 m L 1 キット 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 80 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液 「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 031010

レジメン名称 HER (初回8mg/kg) /Cap/CDDP

投与間隔 21 日

備考 ゼロータ 1000mg/m²/回 day 1-14

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 031010

レジメン名称 HER (初回8mg/kg) /Cap/CDDP

投与間隔 21 日

備考 ゼロータ 1000mg/m²/回 day 1-14

病日 2 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 031010

レジメン名称 HER (初回8mg/kg) /Cap/CDDP

投与間隔 21 日

備考 ゼロータ 1000mg/m²/回 day 1-14

病日 3 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	