

レジメンコード 032007

レジメン名称 FOLFIRI/Bmab

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 5 m g /kg	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) イリナカ塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ ④と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 150 m g /m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 200 m g /m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 15分	100 m L 400 m g /m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 46時間  - 以下余白 -	230 m L 2400 m g /m <sup>2</sup>	