

レジメンコード 032010  
 レジメン名称 FOLFIRI/RAM  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

| <薬品名・用法>   | <用量>                               | <メモ> |
|--|------------------------------------|------|
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」<br>アロカリス点滴静注235mg [10mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>ポララミン注5mg [1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 1 袋<br>1 瓶<br>1 瓶<br>1 管           |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [250mL/袋]<br>サイラムザ点滴静注液500mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>■■全量を250mLとする■■<br>点滴時間は2回目以降、30分に短縮可能。<br>点滴時間 1時間                                   | 250 m L<br>8 m g /kg               |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 15分  | 50 m L                             |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚生食注 [250mL/袋]<br>後) イリガク塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 [5mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>⑤と同時に投与開始<br>点滴時間 2時間  | 250 m L<br>150 m g /m <sup>2</sup> |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚生食注 [250mL/袋]<br>レボホリナート点滴静注用100mg「NP」<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>側管 ④と同時に投与開始<br>点滴時間 2時間   | 250 m L<br>200 m g /m <sup>2</sup> |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>テルモ生食 [100mL/袋]<br>後) フルオロウラシル注1000mg「トロー」 [20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 15分  | 100 m L<br>400 m g /m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 032010  
レジメン名称 FOLFIRI/RAM  
投与間隔 14 日  
備考

病日 1 日目

ページ数：2/2

| <薬品名・用法>   | <用量>  | <メモ> |
|--|---|------|
| <p>埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br/>大塚生食注[250mL/袋]<br/>後) フルオロウラシル注1000mg「トーフ」 [20mL/B]<br/>○化学療法で実施<br/>⑦<br/>生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr)<br/>点滴時間 46時間</p> <p>— 以下余白 —</p> | <p>230 m L<br/>2400 m g / m<sup>2</sup></p> |      |