

レジメンコード 032011

レジメン名称 SIRB

投与間隔 21 日

備考 S-1 80mg/m² day 1夕-15朝

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシマブBS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 7.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) ｲﾝﾌｶﾝ塩酸塩点滴静注液100mg 「SUN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	500 m L 150 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		