

レジメンコード 032012

レジメン名称 XELIRI/BV

投与間隔 21 日

備考 ゼロータ 800mg/m<sup>2</sup>/回 day 1夕-15朝

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシマブBS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 7.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) ｲﾝﾌｶﾝ塩酸塩点滴静注液100mg 「SUN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	250 m L 200 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	100 m L	
— 以下余白 —		