

レジメンコード 032018
 レジメン名称 mFOLFOX6 (大腸癌)
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|--------------------------------------|------|
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 1 袋 1 瓶 1 瓶 | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ② ③と同時に投与開始 点滴時間 2時間 | 250 m L 85 m g / m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 2時間 | 250 m L 200 m g / m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分 | 100 m L 400 m g / m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注 [250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 46時間 - 以下余白 - | 230 m L 2400 m g / m ² | |