

レジメンコード 032021

レジメン名称 mFOLFOXIRI/Bmab

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 1 袋 1 瓶 1 瓶 | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分 | 100 m L 5 m g /kg | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 250 m L 150 m g /m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] エルブラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ④ ⑤と同時に投与開始 点滴時間 2時間 | 250 m L 85 m g /m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 2時間 | 250 m L 200 m g /m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 生食はtotalで240mL、インサナーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 48時間 - 以下余白 - | 240 m L 2400 m g /m ² | |