

レジメンコード 032023
 レジメン名称 FOLFIRI/Pmab
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 1 袋 1 瓶 1 瓶 | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] ベクティビックス点滴静注100mg [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 | 100 m L 6 m g /kg | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) ｲﾝﾌｪｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ ④と同時に投与開始 点滴時間 2時間 | 250 m L 150 m g /m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 2時間 | 250 m L 200 m g /m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 15分 | 100 m L 400 m g /m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 生食はtotalで230mL、ｲﾝﾌｪｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ (5mL/hr) 点滴時間 46時間 - 以下余白 - | 230 m L 2400 m g /m ² | |