

レジメンコード032026

レジメン名称 CPT-11/Cmab (隔週) (500mg/m<sup>2</sup>)

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] アービタックス注射液100mg [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) リナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間30分	250 m L 150 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 15分	50 m L	
— 以下余白 —		