

レジメンコード 033001

レジメン名称 5-FU/CDDP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	1000 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 22時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	

レジメンコード 033001
レジメン名称 5-FU/CDDP
投与間隔 28 日
備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦終了後投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧終了後投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033001

レジメン名称 5-FU/CDDP

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 23時間30分	1500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033001

レジメン名称 5-FU/CDDP

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 23時間30分	1500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033001
 レジメン名称 5-FU/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 23時間30分	1500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033001

レジメン名称 5-FU/CDDP

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 23時間30分	1500 m L	
— 以下余白 —		