

レジメンコード 033003
 レジメン名称 CDGP/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管より①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] アクプラ静注用50mg ○化学療法で実施 ③ 側管より②終了後に投与開始 点滴時間 1時間30分	250 m L 90 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033003
 レジメン名称 CDGP/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の①終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② ①終了後、投与開始 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管より②と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 033003
 レジメン名称 CDGP/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の①終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② ①終了後、投与開始 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管より②と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 033003
 レジメン名称 CDGP/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の①終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② ①終了後、投与開始 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管より②と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 033003
 レジメン名称 CDGP/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の①終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② ①終了後、投与開始 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管より②と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
— 以下余白 —		