

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 40 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液 5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 21時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] 後) フロセミド注 20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管より投与	0.5 管	

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管より投与	0.5 管	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 4 日目

ページ数：5/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管より投与	0.5 管	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 5 日目

ページ数：6/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 6 日目

ページ数：7/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 8 日目

ページ数：8/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		



レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 9 日目

ページ数：9/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 40 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液 5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 21時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] 後) フロセミド注 20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管より投与	0.5 管	

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 9 日目

ページ数：10/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 10 日目

ページ数：11/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管より投与	0.5 管	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 11 日目

ページ数：12/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
静脈内注射 (I V) [外来] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管より投与	0.5 管	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 12 日目

ページ数：13/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 033005

レジメン名称 放射線併用5-FU/CDDP (FP療法)

投与間隔 35 日

備考

病日 13 日目

ページ数：14/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 400 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 8時間	500 m L	
— 以下余白 —		