

レジメンコード 034001
 レジメン名称 FOLFIRINOX
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|--------------------------------------|------|
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 1 袋 1 瓶 1 瓶 | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [500mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間 | 500 m L 85 m g / m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 側管 ②終了後、投与開始 ③ 点滴時間 2時間 | 250 m L 200 m g / m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) イリテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ ③開始30分後に投与開始 点滴時間 1時間30分 | 250 m L 180 m g / m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 | 50 m L 400 m g / m ² | |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注 [250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 46時間 - 以下余白 - | 230 m L 2400 m g / m ² | |