

レジメンコード 034002

レジメン名称 mFOLFIRINOX

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [500mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 85 m g / m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 側管 ②終了後、投与開始 ③ 点滴時間 2時間	250 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) イリテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ ③開始30分後に投与開始 点滴時間 1時間30分	250 m L 150 m g / m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注 [250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 46時間  - 以下余白 -	230 m L 2400 m g / m <sup>2</sup>	