

レジメンコード 034006

レジメン名称 GEM/RT

投与間隔 35 日

備考 GEM (day1, 8, 15, 22, 29) 放射線併用療法

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 034006

レジメン名称 GEM/RT

投与間隔 35 日

備考 GEM (day1, 8, 15, 22, 29) 放射線併用療法

病日 8 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 034006

レジメン名称 GEM/RT

投与間隔 35 日

備考 GEM (day1, 8, 15, 22, 29) 放射線併用療法

病日 15 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 034006

レジメン名称 GEM/RT

投与間隔 35 日

備考 GEM (day1, 8, 15, 22, 29) 放射線併用療法

病日 22 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 034006

レジメン名称 GEM/RT

投与間隔 35 日

備考 GEM (day1, 8, 15, 22, 29) 放射線併用療法

病日 29 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	