

レジメンコード 034010

レジメン名称 GC

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	

レジメンコード 034010

レジメン名称 GC

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 034010

レジメン名称 GC

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	

レジメンコード 034010

レジメン名称 GC

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L	