

レジメンコード 035002

レジメン名称 CDDP/5-FU（肝動注5日間）

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	30 m L 10 m g	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10時間	40 m L 500 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード 035002

レジメン名称 CDDP/5-FU（肝動注5日間）

投与間隔 7 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	30 m L 10 m g	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10時間	40 m L 500 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード 035002

レジメン名称 CDDP/5-FU（肝動注5日間）

投与間隔 7 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	30 m L 10 m g	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10時間	40 m L 500 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード 035002

レジメン名称 CDDP/5-FU（肝動注5日間）

投与間隔 7 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	30 m L 10 m g	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10時間	40 m L 500 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード 035002

レジメン名称 CDDP/5-FU（肝動注5日間）

投与間隔 7 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	30 m L 10 m g	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10時間	40 m L 500 m g	
— 以下余白 —		