

レジメンコード 140003

レジメン名称 DTIC

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	100 m L 250 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140003

レジメン名称 DTIC

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	100 m L 250 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140003

レジメン名称 DTIC

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	100 m L 250 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140003

レジメン名称 DTIC

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	100 m L 250 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140003

レジメン名称 DTIC

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	100 m L 250 m g / m ²	
— 以下余白 —		