

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 12:00-21:00の主管は別にオーダーしてください。 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 8 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 1.8 g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 mL 12 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コワ」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	10 mL/kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	250 mL 100 mg/m ²	

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦終了後投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨開始3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑪終了後9時間後に投与開始 投与速度は、150m l /m ² /h 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ ⑫終了後投与開始 投与速度は、100ml/m ² /h 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 12:00-21:00の主管は別にオーダーしてください。 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 8 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 1.8 g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 mL 12 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コワ」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	10 mL/kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	250 mL 100 mg/m ²	

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦終了後投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨開始3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑪終了後9時間後に投与開始 投与速度は、150m l /m ² /h 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ ⑫終了後投与開始 投与速度は、100m l /m ² /h 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 12:00-21:00の主管は別にオーダーしてください。 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 8 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 1.8 g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 mL 12 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コワ」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	10 mL/kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	250 mL 100 mg/m ²	

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ④開始後3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧開始3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ ①終了後9時間後に投与開始 投与速度は、150m l /m ² /h 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑩終了後投与開始 投与速度は、100m l /m ² /h 点滴時間 10時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 12:00-21:00の主管は別にオーダーしてください。 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 8 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 1.8 g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 mL 12 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コワ」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	10 mL/kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	250 mL 100 mg/m ²	

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ④開始後3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧開始3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ ①終了後9時間後に投与開始 投与速度は、150m l /m ² /h 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑩終了後投与開始 投与速度は、100m l /m ² /h 点滴時間 10時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 12:00-21:00の主管は別にオーダーしてください。 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 8 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 1.8 g/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 mL 12 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コワ」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	10 mL/kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	250 mL 100 mg/m ²	

レジメンコード 140005

レジメン名称 ICE

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ④開始後3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧開始3時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 12 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ ①終了後9時間後に投与開始 投与速度は、150m l /m ² /h 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑩終了後投与開始 投与速度は、100m l /m ² /h 点滴時間 10時間	500 m L	
— 以下余白 —		