

レジメンコード140007

レジメン名称 リツキサン（肝移植）

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|-------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ① リツキサン投与40分前 点滴時間 10分 | 50 m L 1 管 1 瓶 | |
| 点滴注射（D I V） アセリオ静注液1000mgバッグ[100mL/B] ○化学療法で実施 ② リツキサン投与30分前 点滴時間 10分 | 500 m g | |
| 点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] ※リツキサン点滴静注500mg[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ ★糖液は1mg/mLとなるように変更する★ 初めの1時間は25mL/hrで点滴 次の1時間は100mL/hrで点滴 その後は200mL/hrで点滴 | 500 m L 375 m g / m ² | |
| 点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |