

レジメンコード 140303  
 レジメン名称 Regimen I (C2E2)  
 投与間隔 7 日  
 備考 week 3、9、15、21

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>®</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 3.3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
- 以下余白 -		

レジメンコード 140303  
 レジメン名称 Regimen I (C2E2)  
 投与間隔 7 日  
 備考 week 3、9、15、21

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>®</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 3.3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード140303  
 レジメン名称 Regimen I (C2E2)  
 投与間隔 7日  
 備考 week 3、9、15、21

病日 3日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>®</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 3.3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140303  
 レジメン名称 Regimen I (C2E2)  
 投与間隔 7 日  
 備考 week 3、9、15、21

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>®</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 3.3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140303  
 レジメン名称 Regimen I (C2E2)  
 投与間隔 7 日  
 備考 week 3、9、15、21

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>®</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 3.3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
- 以下余白 -		