

レジメンコード 140305
 レジメン名称 Regimen I (V1D1C1)
 投与間隔 7 日
 備考 week 12、18、24

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] オンコビン注射用1mg 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ○化学療法で実施 ①	0.067 m g /kg 10 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
静脈内注射（I V） [外来] ピノルビン注射用10mg ブドウ糖注5%PL「フソ」 [5%20mL/A] ○化学療法で実施 ④	1.5 m g /kg 10 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 30分 ー 以下余白 ー	50 m L 3 m g /kg	

レジメンコード 140305
 レジメン名称 Regimen I (V1D1C1)
 投与間隔 7 日
 備考 week 12、18、24

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140305
 レジメン名称 Regimen I (V1D1C1)
 投与間隔 7 日
 備考 week 12、18、24

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 14.7 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 3 m g /kg	
— 以下余白 —		