

レジメンコード 140403  
 レジメン名称 IVA-9- I  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始1時間後より投与開始 点滴時間 4時間	200 m L 3 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管) ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) ②終了後投与開始 点滴時間 2時間	10 m L / kg	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤終了後投与開始 点滴時間 10分	20 m L 1.5 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 140403  
 レジメン名称 IVA-9- I  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥終了後投与開始 点滴時間 10分	20 m L 1.5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ⑧開始1時間後より投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / kg	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管) ⑩開始1時間後より投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / kg	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 140403  
レジメン名称 IVA-9- I  
投与間隔 21 日  
備考

病日 1 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 140403  
 レジメン名称 IVA-9- I  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始1時間後より投与開始 点滴時間 4時間	200 m L 3 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管) ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) ②終了後投与開始 点滴時間 2時間	10 m L / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 140403  
 レジメン名称 IVA-9- I  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥開始1時間後より投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ⑧開始1時間後より投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 4時間  - 以下余白 -	500 m L 1 管	

レジメンコード 140403  
 レジメン名称 IVA-9- I  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始1時間後より投与開始 点滴時間 4時間	200 m L 3 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管) ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) ②終了後投与開始 点滴時間 2時間	10 m L / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 140403  
 レジメン名称 IVA-9- I  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥開始1時間後より投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ⑧開始1時間後より投与開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 4時間  - 以下余白 -	500 m L 1 管	