

レジメンコード 140501
 レジメン名称 low-CITA
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② ④投与中（3時間）は止め 点滴時間 21時間	2000 m L / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 12時間	500 m L / m ² 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ ②開始3時間後より投与開始（②は中断） 点滴時間 3時間	10 m L / kg	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 12時間 — 以下余白 —	500 m L / m ² 20 m g / m ²	

レジメンコード 140501
レジメン名称 low-CITA
投与間隔 28 日
備考

病日 2 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ピノルビン注射用10mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	50 m L 30 m g / m ²	