

レジメンコード 140502

レジメン名称 CITA

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 mL/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② ④投与中 (3時間) は止め 点滴時間 21時間	2000 mL/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 12時間	500 mL/m <sup>2</sup> 40 mg/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ ②開始3時間後より投与開始 (②は中断) 点滴時間 3時間	10 mL/kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 12時間	500 mL/m <sup>2</sup> 40 mg/m <sup>2</sup>	
- 以下余白 -		

レジメンコード 140502

レジメン名称 CITA

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ピノルビン注射用10mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	50 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 140502

レジメン名称 CITA

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ピノルビン注射用10mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	50 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	