

レジメンコード 140503

レジメン名称 ITEC

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 ⑦, ⑧投与中(2時間)は止め 点滴時間 22時間	1440 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ③ ②と同時に投与開始 側管 ⑧投与中(1時間)は止め 点滴時間 23時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	50 m L 3 g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 600 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	10 m L /kg	

レジメンコード 140503

レジメン名称 ITEC

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ④開始4時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	250 m L / m ² 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	50 m L 600 m g / m ²	

レジメンコード 140503

レジメン名称 ITEC

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 ⑦, ⑧投与中(2時間)は止め 点滴時間 22時間	1440 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ③ ②と同時に投与開始 側管 ⑧投与中(1時間)は止め 点滴時間 23時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	50 m L 3 g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 600 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	10 m L /kg	

レジメンコード 140503

レジメン名称 ITEC

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ④開始4時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	250 m L / m ² 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	50 m L 600 m g / m ²	

レジメンコード 140503

レジメン名称 ITEC

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 ④投与中(1時間)は止め 点滴時間 23時間	2250 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 24時間	200 m L /m ² 400 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト ^ド 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L /m ² 100 m g /m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140503

レジメン名称 ITEC

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 ④投与中(1時間)は止め 点滴時間 23時間	2250 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ①終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 30 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト ^ド 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ ①終了後1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	250 m L /m ² 100 m g /m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140503

レジメン名称 ITEC

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KNMG 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 ④投与中(1時間)は止め 点滴時間 23時間	2250 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ①終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 30 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト ^ド 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ ①終了後1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	250 m L /m ² 100 m g /m ²	
— 以下余白 —		