

レジメンコード140606

レジメン名称 LI-B (体重10kg未満/日齢182日以下)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パップ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 12分	10 m L 0.025 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	5 m L /kg 10 m g /kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード140606

レジメン名称 LI-B (体重10kg未満/日齢182日以下)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注5%PL「アソ」20mL ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 12分 — 以下余白 —	10 m L 0.5 m g /kg	