

レジメンコード140608

レジメン名称 LI-D (体重10kg未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	300 m L / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始30分後より投与開始 点滴時間 30分	0.04 m g / kg 0.5 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 30分	10 m L 0.05 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用エンドキサン500mg ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ ①終了後投与開始 点滴時間 1時間	5 m L / kg 30 m g / kg 6 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ④終了後投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 0.4 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L / kg	

レジメンコード140608

レジメン名称 LI-D (体重10kg未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後投与開始 点滴時間 30分	10 m L 6 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦終了後投与開始 点滴時間 3時間30分	200 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧終了後投与開始 点滴時間 30分	10 m L 6 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨終了後投与開始 点滴時間 14時間30分 — 以下余白 —	900 m L /m ²	

レジメンコード140608

レジメン名称 LI-D (体重10kg未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 ②開始1時間前より投与開始 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	120 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ ②終了後投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 0.4 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 19時間 — 以下余白 —	1200 m L /m ²	

レジメンコード140608

レジメン名称 LI-D (体重10kg未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 ②開始1時間前より投与開始 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	120 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注5%PL「フー」20mL ピノルビン注射用10mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	10 m L 1 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ ②終了後投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 0.4 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 19時間 — 以下余白 —	1200 m L /m ²	

レジメンコード140608

レジメン名称 LI-D (体重10kg未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 ②開始1時間前より投与開始 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	120 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ ②終了後投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 0.4 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 19時間 — 以下余白 —	1200 m L /m ²	

レジメンコード140608

レジメン名称 LI-D (体重10kg未満)

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 ②開始1時間前より投与開始 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	120 m L /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ ②終了後投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 0.4 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 19時間 — 以下余白 —	1200 m L /m ²	