

レジメンコード 140703
 レジメン名称 VC (1歳以上3歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 200mL/m ² /hr 点滴時間 5時間	1000 mL/m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始1時間後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管) ②開始20分後より投与開始 点滴時間 5分	10 mL 0.05 mg/kg	
点滴注射 (D I V) ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管) ⑤投与開始15分前より投与開始 点滴時間 15分	14.6 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管) ④終了後、投与開始 点滴時間 30分	50 mL 73 mg/kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 125mL/m ² /hr 点滴時間 21時間	2625 mL/m ²	

レジメンコード 140703
 レジメン名称 VC (1歳以上3歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑤投与終了4時間後より投与開始 点滴時間 15分	14.6 m g /kg	
点滴注射 (D I V) ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑤投与終了8時間後より投与開始 点滴時間 15分	14.6 m g /kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140703
 レジメン名称 VC (1歳以上3歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 150mL/m ² /hr 点滴時間 24時間	3600 mL/m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始30分後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用 1mg ○化学療法で実施 ③ 側管) ②開始30分後より投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	10 mL 0.05 mg/kg	

レジメンコード 140703
 レジメン名称 VC (1歳以上3歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 150mL/m ² /hr 点滴時間 24時間	3600 mL/m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始30分後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管) ②開始30分後より投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	10 mL 0.05 mg/kg	