

レジメンコード 050004

レジメン名称 LI-D

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 側管 ①終了後投与開始 点滴時間 30分	10 m L 1.5 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了30分後、投与開始 点滴時間 1時間	5 m L /kg 900 m g /m ² 180 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 12 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤投与終了後、投与開始 点滴時間 30分	10 m L 180 m g /m ²	

レジメンコード 050004

レジメン名称 LI-D

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ③投与開始8時間後、投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	10 m L 180 m g / m ²	

レジメンコード 050004

レジメン名称 LI-D

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与終了2時間後、投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 12 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L /kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 050004

レジメン名称 LI-D

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注5%PL「フー」20mL ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与終了後、投与開始 点滴時間 30分	10 m L 30 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②投与開始2時間後、投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 12 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	10 m L /kg	

レジメンコード 050004

レジメン名称 LI-D

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与終了2時間後、投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 12 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間	10 m L /kg	
- 以下余白 -		

レジメンコード 050004

レジメン名称 LI-D

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 0.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与終了2時間後、投与開始 点滴時間 22時間	500 m L 12 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	10 m L /kg	