

レジメンコード051001

レジメン名称 CBDCA/VCR① (day1, 8, 15, 22)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 1時間	100 m L 175 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ①開始2時間後 点滴時間 5分	10 m L 1.5 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①投与開始12時間後 点滴時間 30分  - 以下余白 -	0.04 m g /kg	

レジメンコード051001

レジメン名称 CBDCA/VCR① (day1, 8, 15, 22)

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 1時間	100 m L 175 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ①開始2時間後 点滴時間 5分	10 m L 1.5 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①投与開始12時間後 点滴時間 30分  — 以下余白 —	0.04 m g /kg	

レジメンコード 051001

レジメン名称 CBDCA/VCR① (day1, 8, 15, 22)

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 1時間	100 m L 175 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ①開始2時間後 点滴時間 5分	10 m L 1.5 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①投与開始12時間後 点滴時間 30分  — 以下余白 —	0.04 m g /kg	

レジメンコード051001

レジメン名称 CBDCA/VCR① (day1, 8, 15, 22)

投与間隔 28 日

備考

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 1時間	100 m L 175 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ①開始2時間後 点滴時間 5分	10 m L 1.5 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①投与開始12時間後 点滴時間 30分  - 以下余白 -	0.04 m g /kg	