

レジメンコード 052151  
 レジメン名称 JRS-II AC1.2 (1歳未満)  
 投与間隔 7 日  
 備考 week 10

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後 点滴時間 1分	5 mL 0.025 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 注射用エンドキサン500mg ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 主管 側管②開始30分後 点滴時間 30分	50 mL 40 mg/kg 240 mg/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 主管エンドキサン投与終了から4時間後 点滴時間 30分	50 mL 240 mg/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 主管エンドキサン投与終了から8時間後 点滴時間 30分	50 mL 240 mg/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 側管①開始12時間後 点滴時間 30分  - 以下余白 -	0.04 mg/kg	