

レジメンコード 052282
 レジメン名称 JRS-II VIn (1-3歳)
 投与間隔 7 日
 備考 week 7、13、16、31、34

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始30分後 点滴時間 5分	10 m L 0.05 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) リナカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 主管 側管②開始30分後 点滴時間 1時間30分	100 m L 50 m g /m ²	
- 以下余白 -		

レジメンコード 052282
 レジメン名称 JRS-II VIrin (1-3歳)
 投与間隔 7日
 備考 week 7、13、16、31、34

病日 2日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 主管 側管①開始1時間後 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	100 mL 50 mg/m ²	

レジメンコード 052282
 レジメン名称 JRS-II VIrin (1-3歳)
 投与間隔 7日
 備考 week 7、13、16、31、34

病日 3日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) リゾカド塩酸塩点滴静注液 40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 主管 側管①開始1時間後 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	100 mL 50 mg/m ²	

レジメンコード 052282
 レジメン名称 JRS-II VIrin (1-3歳)
 投与間隔 7日
 備考 week 7、13、16、31、34

病日 4日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 主管 側管①開始1時間後 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	100 mL 50 mg/m ²	

レジメンコード 052282
 レジメン名称 JRS-II VIrin (1-3歳)
 投与間隔 7日
 備考 week 7、13、16、31、34

病日 5日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 主管 側管①開始1時間後 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	100 mL 50 mg/m ²	