

レジメンコード 052333
 レジメン名称 JRS-II VAC2.2 (3歳以上)
 投与間隔 7日
 備考 week 10、22、25、28、34、37、40

病日 1日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッガ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始30分後 点滴時間 5分	10 mL 1.5 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②開始30分後 点滴時間 1分	5 mL 0.045 mg/kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用エンドキサン500mg ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 主管 側管③開始30分後 点滴時間 30分	50 mL 2200 mg/m ² 440 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 主管エンドキサン投与終了から4時間後 点滴時間 30分	50 mL 440 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 主管エンドキサン投与終了から8時間後 点滴時間 30分	50 mL 440 mg/m ²	

レジメンコード 052333

レジメン名称 JRS-II VAC2.2 (3歳以上)

投与間隔 7 日

備考 week 10、22、25、28、34、37、40

病日 1 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 側管 側管①開始12時間後 点滴時間 30分 — 以下余白 —	0.04 m g /kg	