

レジメンコード 053002
 レジメン名称 VAC (1-3歳)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 5分	10 m L 0.05 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 15分	5 m L 0.045 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用エンドキサン500mg ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 主管 側管②開始1時間後 点滴時間 30分	50 m L 1200 m g /m ² 480 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 主管 点滴時間 5分	10 m L	

レジメンコード 053002
 レジメン名称 VAC (1-3歳)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 主管エンドキサン投与終了から4時間後 点滴時間 30分	50 m L 480 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 主管エンドキサン投与終了から8時間後 点滴時間 30分	50 m L 480 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注ハック 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑨ 側管 側管①開始12時間後 点滴時間 30分 - 以下余白 -	0.04 m g / kg	

レジメンコード 053002
 レジメン名称 VAC (1-3歳)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 5分	10 m L 0.05 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分 — 以下余白 —	10 m L	

レジメンコード 053002
 レジメン名称 VAC (1-3歳)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 5分	10 m L 0.05 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分 — 以下余白 —	10 m L	