

レジメン変更申請一覧

2014.05.08

外科

ピカネイト輸液が取扱い中止のため、以下のレジメンの組成を変更しました。

レジメン名	変更箇所
CDDP/S-1	①⑤本目 ビ`ｶﾞﾈｲﾄ→生食500mL+KCL 10mEq+MgSO ₄ 4mEq、ﾌﾟ`ｲﾂﾄﾞ、ﾌﾗｯｼ1用生食→削除
GC	①⑤本目 ビ`ｶﾞﾈｲﾄ→生食500mL+KCL 10mEq+MgSO ₄ 4mEq、ﾌﾟ`ｲﾂﾄﾞ、ﾌﾗｯｼ1用生食→削除
DCS	①本目 ビ`ｶﾞﾈｲﾄ→生食500mL+MgSO ₄ 8mEq、⑧本目 ビ`ｶﾞﾈｲﾄ→生食500mL

乳腺センター

アレルギー反応予防対策としてデキサートを含む輸液の投与順を変更しました。

レジメン名	変更箇所
PH (初回)	①本目に追加：生食50mL+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg
PH (継続)	①本目に追加：生食50mL+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg
PHD (初回)	④本目→①本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg
PHD (継続)	④本目→①本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg
PHP (初回)	④本目→①本目：生食50mL+ﾃ`ｷﾞｰﾄ19.8mg+ﾚ`ｼﾞﾝ1A+ｶ-ﾙｼﾞﾝ1A、⑤本目→②本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V
PHP (継続)	④本目→①本目：生食50mL+ﾃ`ｷﾞｰﾄ19.8mg+ﾚ`ｼﾞﾝ1A+ｶ-ﾙｼﾞﾝ1A、⑤本目→②本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V
PHV (初回)	④本目→①本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg
PHV (継続)	④本目→①本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg
PHA (初回)	④本目→①本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg
PHA (継続)	④本目→①本目：生食50mL+ｱ`ｷﾝ1V+ﾃ`ｷﾞｰﾄ6.6mg