

## レジメン変更申請一覧

2015.02.12

### 産婦人科

レジメン名	変更箇所
AP	DEX : 9.9mg、13.2mg
DC	制吐剤 : グラニセトロン→アロキシ、テルペラン削除、DEX : 4.95mg、9.9mg
TC	制吐剤 : グラニセトロン→アロキシ、テルペラン削除、DEX : 9.9mg、19.8mg
dd-TC	制吐剤 : グラニセトロン→アロキシ、テルペラン削除、DEX : 6.6mg、9.9mg イメンド併用時、ワルファリン服用時に対応するためデキササートの投与量を2規格登録しました。

### 血液内科

レジメン名	変更箇所
IDA/Ara-C (寛解導入)	グラニセトロン→アロキシ
DNR/Ara-C (寛解導入)	グラニセトロン→アロキシ
DNR/Ara-C (地固め)	グラニセトロン→アロキシ
Hyper-CVAD	グラニセトロン→アロキシ
HD-MTX/Ara-C大量	ロイコボリン静注→点滴静注
ABVD療法 (寛解導入)	グラニセトロン→アロキシ、プレオ投与前にサクシゾン追加
リツキサン単独療法	サクシゾン静注→点滴静注、休薬完了期間2日→1日
CHOP療法 (制吐剤アロキシ)	グラニセトロン→アロキシのレジメンを追加
R-CHOP療法	サクシゾン静注→点滴静注
R-CHOP療法 (制吐剤アロキシ)	サクシゾン静注→点滴静注、グラニセトロン→アロキシ、R day1/CHOP day2
DeVIC療法	グラニセトロン→アロキシ
ESHAP療法	グラニセトロン→アロキシ
HDMTX/HDAC	グラニセトロン→アロキシ
EPOCH	グラニセトロン→アロキシ
GDP	グラニセトロン→アロキシ