

## 第二外科 レジメン微調整、削除申請一覧

第二外科より各レジメンにプロイメンド追加の申請がありました。プロイメンドは、アロキシやガスターと配合変化があり、用法は希釈溶液100mL以上、投与時間30分以上と添付文書に記載されています。よって、下表のように変更いたしました。また、レジメン名称の変更、標準投与量への変更、エビデンス不足のレジメン削除も併せてよろしくお願ひ致します。

	レジメン名	名称変更	投与量変更	制吐剤変更	投与時間
胃癌	PAC (胃癌)	PAC	70mg/m <sup>2</sup> →80mg/m <sup>2</sup>	プロイメンド追加 (生食50→100mL)	
	PAC/S-1		day1,8,15 (4week) →day1,8 (3week)	プロイメンド追加 (生食50→100mL)	
	PAC (biweekly) /S-1	削除			
	DOC (胃癌)	削除			
	DOC/S-1	削除			
	低用量CDDP/S-1	削除			
	高用量CDDP/S-1	S-1/CDDP	別紙参照		
	CPT-11 (胃癌)	CPT-11	100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 (4week) →150/m <sup>2</sup> day1 (2week)	プロイメンド追加 (生食50→100mL)	
	CPT-11/S-1 (胃癌)			プロイメンド追加 (生食50→100mL)	
	CPT-11/CDDP		KN1号500mL+DEX3V→生食500mL+DEX1.5V	プロイメンド追加 (生食50→100mL)	

	レジメン名	名称変更	投与量変更	制吐剤変更	投与時間
大腸癌	IRIS		1本目の輸液削除	プロイメンド追加 (生食50→100mL)、アキシ→グラセトン	
	FOLFIRI		1本目の輸液削除	プロイメンド追加 (生食50→100mL)、アキシ→グラセトン	
	FOLFIRI/BV		1本目の輸液削除	プロイメンド追加 (生食50→100mL)、アキシ→グラセトン	15分→30分
	mFOLFOX6		1本目の輸液削除	プロイメンド追加 (生食50→100mL)、アキシ→グラセトン	
	mFOLFOX6/BV		1本目の輸液削除	プロイメンド追加 (生食50→100mL)、アキシ→グラセトン	15分→30分
	CPT-11/Cetuximab (400mg/m <sup>2</sup> )		1本目の輸液削除	プロイメンド追加、アキシ→グラセトン	
	CPT-11/Cetuximab (250mg/m <sup>2</sup> )		1本目の輸液削除	プロイメンド追加、アキシ→グラセトン	
	XELOX		1本目の輸液削除	プロイメンド追加 (生食50→100mL)、アキシ→グラセトン	
	XELOX/BV		1本目の輸液削除	プロイメンド追加 (生食50→100mL)、アキシ→グラセトン	15分→30分
	FOLFIRI/Cetuximab (導入)		1本目の輸液削除	プロイメンド追加、アキシ→グラセトン	
	FOLFIRI/Cetuximab (継続)		1本目の輸液削除	プロイメンド追加、アキシ→グラセトン	
	mFOLFOX6 (アレルギー)		1本目の輸液削除	プロイメンド追加、アキシ→グラセトン、ガスター→ザンタック	
	mFOLFOX6 (アレルギー) /BV		1本目の輸液削除	プロイメンド追加、アキシ→グラセトン、ガスター→ザンタック	

	XELOX (アレルギー)		1本目の輸液削除	プロメド追加、アキ→グロセロン、カスター→ザンタック	
	XELOX (アレルギー) /BV		1本目の輸液削除	プロメド追加、アキ→グロセロン、カスター→ザンタック	
	mFOLFOX6/Panitumumab		1本目の輸液削除	プロメド追加 (生食50→100mL)、アキ→グロセロン	15分→30分
	FOLFIRI/Panitumumab		1本目の輸液削除	プロメド追加 (生食50→100mL)、アキ→グロセロン	15分→30分

	レジメン名	名称変更	投与量変更	制吐剤変更	投与時間
膀胱癌	GEM (3投1休)			プロメド追加 (生食50→100mL)、アキ→グロセロン	15分→30分
胆道癌	GEM (2投1休)			プロメド追加 (生食50→100mL)、アキ→グロセロン	15分→30分
	GEM (1投1休)			プロメド追加 (生食50→100mL)、アキ→グロセロン	15分→30分

	レジメン名	名称変更	投与量変更	制吐剤変更	投与時間
肝癌	TACE			プロメド追加、アキ→グロセロン	